

Impfempfehlung Covid-19 für Kinder und Jugendliche

(nach RKI Epid. Bulletin 33/2022 - Stand August 2022)

Kinder von 5-11 Jahren

gesunde Kinder: EINE Impfstoffdosis – Abstand zu gesicherter Infektion: mind. 3 Mon.

gesunde Kinder, die enge Kontaktpersonen sind (=in deren Umfeld sich Angehörige oder andere Kontaktpersonen mit hoher Gefährdung für einen schweren COVID-19-Verlauf befinden, die selbst nicht geimpft werden können oder bei denen der begründete Verdacht auf einen nicht ausreichenden Schutz nach Impfung besteht (z.B. Menschen unter relevanter immunsuppressiver Therapie) oder bei starkem individuellem Wunsch: Grundimmunisierung mit ZWEI Impfungen im Abstand von (3-) 4 Wochen

Kinder mit folgenden Risikofaktoren: ZWEI Impfungen im Abstand von (3-) 4 Wochen + EINE Auffrischimpfung nach 6 Mon. (+ ggf zweite Auffrischimpfung nach ärztlicher Indikationsstellung nach weiteren 3-6Mon.)

- Adipositas (starkes Übergewicht, BMI >97. Perzentile)
 - Trisomie 21 (Down-Syndrom)
 - syndromale Erkrankungen mit schwerer Beeinträchtigung
 - chronische neurologische oder neuromuskuläre Erkrankungen
 - Diabetes mellitus
 - schweres, unkontrolliertes Asthma
 - angeborene oder erworbene Immundefizienz oder relevante Immunsuppression
 - angeborene zyanotische Herzfehler (O₂-Ruhesättigung < 80 %) und Einkammerherzen nach Fontan-Operation
 - schwere Herzinsuffizienz und schwere pulmonale Hypertonie
 - chronische Lungenerkrankungen mit einer anhaltenden Einschränkung der Lungenfunktion
 - chronische Nierenerkrankung und maligne Tumorerkrankungen („Krebs“)
- bereits zweifach vorgeimpfte Kinder, die zwischenzeitlich nachweislich eine Infektion durchgemacht haben, benötigen dann eine Auffrischimpfung, wenn zwischen der 2. Impfung und der Infektion weniger als drei Monate lagen

Jugendliche ab 12 Jahre

- generelle Empfehlung für eine Grundimmunisierung mit zwei Impfungen im Abstand von (3-) 4 Wochen und eine Auffrischimpfung nach 6 Monaten. Eine nachgewiesene Infektion zum Zeitpunkt einer möglichen Impfung zählt wie eine Impfung.
- Jugendliche mit Risikofaktoren nach obenstehender Liste wird eine 4. Impfung im Abstand von 6 Monaten zur Auffrischimpfung empfohlen