

STIKO-Empfehlung zur Grundimmunisierung von Kindern zwischen sechs Monaten und vier Jahren Stand 1.11.2022

Für Immungesunde Kinder unter fünf Jahren ohne Vorerkrankungen empfiehlt die STIKO derzeit keine COVID-19-Impfung.

Empfehlung zur Grundimmunisierung von Kindern mit Vorerkrankungen bei erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf einer COVID-19-Infektion, zum Beispiel:

- ▶ Adipositas (> 97. Perzentile des Body Mass Index)
- ▶ Frühgeburtlichkeit bei Kindern im Alter < 2 Jahren
- ▶ Trisomie 21
- ▶ Syndromale Erkrankungen mit schwerer Beeinträchtigung
- ▶ Chronische neurologische oder neuromuskuläre Erkrankungen
- ▶ Chronische Lungenerkrankungen mit einer anhaltenden Einschränkung der Lungenfunktion
- ▶ Chronische Nierenerkrankungen
- ▶ Angeborene oder erworbene Immundefizienz oder relevante Immunsuppression
- ▶ Angeborene zyanotische Herzfehler (O₂-Ruhe-sättigung < 80 %) und Einkammerherzen nach Fontan-Operation
- ▶ Schwere Herzinsuffizienz
- ▶ Schwere pulmonale Hypertonie
- ▶ Tumorerkrankungen und maligne hämatologische Erkrankungen („Krebs“)

Impfstoff und Impfschema

- 3 Dosen des mRNA-Impfstoffs Comirnaty (BioNTech/Pfizer) in altersgemäß zugelassener Formulierung (3 µg pro Dosis) nach dem Schema 0-3-8 Wochen
- nach gesicherter SARS-CoV-2-Infektion (PCR-Nachweis oder spezifische Serologie) 2 Dosen Comirnaty (BioNTech/Pfizer) in altersgemäß zugelassener Formulierung (3 µg pro Dosis) im Abstand von 12 Wochen, Abstand Infektion-Impfung: 6 Monate
- bei Kindern mit Immundefizienz sollte im Einzelfall entschieden werden, ob 2 Dosen zur Grundimmunisierung ausreichen (s. Kapitel 8 der COVID-19-Impfempfehlung in der 23. Aktualisierung).